

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 29-5-69 932825

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE) (Tél. 86-31-55 et 86-32-55)

PROTECTION DES VEGETAUX - Rue St-Jean prolongée
B. P. n° 20 — 31 - BALMA

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne
Rue St-Jean prolongée - BALMA
C. C. P. 8612-11 TOULOUSE

- Supplément n° 2 au Bulletin technique n° 104 de mai 1969 -

1969-12

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Mildiou :

La situation est actuellement la suivante : les foyers sont extrêmement nombreux en tous secteurs mais, généralement, de peu d'importance si les mesures conseillées dans les bulletins des 5 et 13 mai ont été prises, notamment la suppression des repousses de la base sur lesquelles on trouve la grande majorité des taches.

Nous conseillons donc de poursuivre rapidement le nettoyage des souches qui permettra de réduire très efficacement le nombre de germes actifs.

Si un traitement n'a pas été mis en place tout récemment, le faire sans attendre en soignant particulièrement l'application.

Black-rot :

Dans les foyers, (vignes plus ou moins abandonnées) des taches parfois nombreuses sont apparues à partir du 13 mai, puis à partir du 18 mai. Les sorties se poursuivent en ce moment et d'autres vont se produire vers la fin de cette semaine. Le traitement conseillé contre le mildiou agira contre le black-rot.

Vers de la grappe :

Des pontes ont été déposées et les premières éclosions de chenilles de quelque importance vont avoir lieu dans les prochains jours. En conséquence, dans les vignes habituellement très sensibles aux vers, un traitement devra être appliqué dès le début de la semaine prochaine avec un produit de type préventif (arséniate de plomb de préférence, notamment dans les vignes où l'on redoute les attaques d'araignées rouges ou jaunes.

ARBRES FRUITIERS

Tavelures du poirier et du pommier :

Les projections d'ascospores ne sont pas encore complètement terminées, alors que le nombre de taches est très important dans certains vergers. Il y aurait donc lieu de renouveler la protection dès la première menace de pluie.

Carpocapse des prunes :

Des pontes ont été déposées en nombre encore faible. Cependant, dans les vergers où l'insecte commet des dégâts habituellement, un traitement pourrait être effectué dans les jours à venir. Ajouter l'un des fongicides cités dans le précédent bulletin à la rubrique concernant la rouille du prunier.

P.1.181

Carpocapse des pommes et des poires :

Dans les vergers très sensibles (vergers d'amateurs ou plantations situées à proximité d'agglomération) on pourrait appliquer un traitement dans les premiers jours de la semaine prochaine.

INFORMATIONS

VIGNE

Excoriose :

Dans de nombreuses vignes (Gers, Tarn, Tarn-et-Garonne notamment) la végétation apparaît mauvaise et, dans les cas les plus graves, les jeunes sarments accusent une courbure anormale. A leur base en particulier, l'épiderme est gris brunâtre, présentant parfois des fentes, le plus souvent longitudinales, quelquefois transversales. Les premières feuilles sont maculées de points d'abord décolorés, puis rougeâtres ou noirâtres. Le limbe est déformé, en creux vers la face inférieure, recroquevillé. Les feuilles de la base finissent par tomber.

De nombreux viticulteurs confondent ces manifestations avec les attaques d'araignées rouges ou jaunes. Dans le cas de doute, nous adresser des échantillons, placés frais dans un sachet en matière plastique, afin de ne pas appliquer inconsidérément des produits acaricides.

BALMA, 1e 22 MAI 1969

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,

L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES".

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX